

日本で承認されている新型コロナウイルスワクチン

(2021年7月12日時点)

ワクチン名 [製造販売(開発)]	コミナティ筋注 [ファイザー]	COVID-19 ワクチン モデルナ筋注 [武田(モデルナ)]	バキスゼブリア筋注 [アストラゼネカ]
ワクチンのタイプ	mRNA ワクチン	mRNA ワクチン	ウイルスベクターワクチン
対象年齢	12 歳以上	18 歳以上	18 歳以上
接種回数 (接種間隔)	2 回 (3 週間隔)	2 回 (4 週間隔)	2 回 (4~12 週間隔)
発症予防効果	95%	94%	72%(接種間隔が 8~12 週間隔) 50%(接種間隔が 4~8 週間隔)
副反応	軽いもの (60%以上の確率)	・注射したところの痛み ・だるさ	・注射したところの痛み ・だるさ ・頭痛 ・筋肉痛
	軽いもの (30~59%の確率)	・頭痛 ・筋肉痛 ・寒気	・関節の痛み ・寒気
	軽いもの (5~29%の確率)	・関節痛 ・発熱 ・下痢 ・注射したところの腫れ、赤み	・発熱 ・注射したところの赤み
	重いもの (頻度不明)	・アナフィラキシー、アナフィラキシー ショック	・アナフィラキシー、アナフィラキシー ショック

※1 血管内に血のかたまり(血栓)ができ、血管が詰まって血流が途絶え、それが原因で起こるもの

※2 血管内にできた血栓が剥がれて流され、流された先の血管を塞いで血流が途絶え、それが原因で起こるもの

(参考 コミナティ筋注、COVID-19 ワクチンモデルナ筋注、バキスゼブリア筋注の各添付文書(一部改変))